

「除菌・洗浄剤」清掃作業マニュアル

使用洗剤



オキシヴィルファイブ 1.5L

使用ツール



ふきとりJワイパー ジョンマスターダンプモップ

使用上の注意

酸性タイプ




塩素系と併用不可

- 塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て**危険**。
- 目に入ったらすぐ水で洗う。
- 必ず炊事用手袋を使用する。
- 子供の手に触れないように注意する。

※ご使用前に必ず製品ラベルに表示されている「使用上の注意」をよくお読みください。

希釈方法



嘔吐物・糞便 血液などの処理	浴室・トイレ清掃	日常の清掃	日常の軽い清掃	水	止
16 倍	64 倍	128 倍	256 倍		

清掃箇所	清掃頻度 希釈倍率	希釈ツール	作業方法
テーブル ドアノブ 鏡 手すり 洗面台	毎日 128 倍 256 倍	スプレーヤーに希釈	1. ふきとりJワイパーに希釈液を噴霧する。 2. 対象面に30秒間、乾かない程度塗布する。
床	毎日 128 倍 256 倍	スプレーヤーに希釈	1. ダスタークロスもしくはドライモップ等で防塵する。 2. ジョンマスターダンプモップに希釈液を適量噴霧する。 3. 8の字もしくは一定方向に床面を拭き上げる。(前進方向)
トイレ (便器)	毎日 64 倍	スプレーヤーに希釈	1. 希釈液を便器に噴霧する。 2. トイレブラシで洗浄し、すすぐ。
トイレ (便座)	毎日 64 倍	スプレーヤーに希釈	1. トイレ専用ふきとりJワイパーに希釈液を噴霧する。 2. 対象面に30秒間、乾かない程度塗布する。
浴室	毎日 64 倍	バケツに希釈	※作業中・作業後は窓を開けて換気する 1. 希釈液にスポンジを浸す。 2. 浴室内をスポンジ洗浄する。 3. 流水ですすぎ、乾燥させる。
嘔吐物処理 血液処理	随時 16 倍	スプレーヤーに希釈	1. 使い捨て手袋、マスク、エプロン、保護メガネを着用する。 吐物が広い範囲に広がっている場合は、靴カバーを着用する。 2. 汚染場所に関係者以外を近づけないようにする。 3. ペーパータオル等で外側から内側に向けて拭き取り面を折り込みながら拭き取り、密閉して処分する。 4. 希釈液を染み込ませたペーパータオル等で覆い、浸して拭き上げ、5分以上置いてから水拭きする。